

Fibroma intersticial do Utero e prenhez de dois mezes

Dr. Mario Totta

Prof. de pathologia geral.

Arrola-se entre os phenomenos de pouca frequencia, nos dominios da gynecologia e da obstetricia, a coexistencia de uma gravidez e de um fibroma uterino.

Tão escassa é, com effeito, a parceria desses dois estados, o physiologico e o morbido, que a penna de Louis chegou a sentenciar um dia, em memoria á Academia de Cirurgia de Paris, que "a existencia de um tumor fibroso excluía a possibilidade da prenhez".

Destroe esse conceito, evidentemente extremado, a estatistica de todos os gynecologos e parteiros, a começar nos contemporaneos do cirurgião francez até os de hoje; mas dos proprios algarismos dessas estatisticas emerge, incontestemente, a raridade da hospedagem dada á gravidez pelo utero fibromatoso.

D'ahi, e porque não tenhamos sabido de outra observação entre nós, o relato do caso que segue, occorrido com uma senhora de mais ou menos trinta annos, branca, casada, nullipara e sem antecedentes hereditarios ou pessoas dignos de menção.

Menstruada pela primeira vez aos treze annos, S. B. teve sempre as suas regras normaes, embora um pouco dolorosas; vinham em epochas fixas e duravam de quatro a cinco dias. Não teve jámais hemorragias.

No intervallo dos catamenios, appareciam, quando a quando, algumas perdas brancas, insignificantes, manchando de leve as roupas e desapparecendo rapidamente.

Casada ha dois annos, S. B... continuou a ser menstruada com a mesma pontualidade, excepção feita dos dois ultimos mezes, em que as regras faltaram.

Quando fui chamado, queixava-se a doente de dores que desde alguns dias a atormentavam e que ella attribuía a um longo

passeio de carro que fizera, na campanha, por estradas de terreno accidentado. Essas dores, que a cruciavam, principalmente á noite, se localisavam na região lombar e no baixo ventre, irradiando d'ahi para as côxas.

E era essa toda a sua historia.

Temperatura normal; pulso regular e cheio. Nenhuma anormalidade para o lado dosapparelhos respiratorio e circulatorio.

Examinando o ventre, percebi, pela palpação, a existencia de um tumor redondo, liso, de consistencia fibrosa, projectado da symphise pubiana para a fossa illiaca direita, onde se tornava facil limitar-lhe o contorno superior, distante mais ou menos quatro dedos transversos do ramo horizontal do pubis. Em baixo, o tumor immergia na excavação.

Pelo palpar combinado, verifiquei que o tumor fazia corpo com o utero, guardando de cima a baixo a mesma consistencia dura, excepção feita com relação ao collo, que era molle, curto e notavelmente desviado para a esquerda. Fundos de sacco inteiramente tomados e um tanto dolorosos ao tocar. Logo acima da symphise pubiana, no ponto em que o tumor começava a sua obliquidade, percebia-se nelle um ligeiro sulco.

A' auscultação nada mais que um leve ruido de sopro. A' pesquisa das contracções pelo methodo de Pinard foi negativa. Não havia movimentos fetaes. A doente não accusava symptomas de compressão para o lado da bexiga. S. B... era uma constipada chronica. A urina tinha bom aspecto.

Firmei desde logo o diagnostico de um fibroma intersticial do utero, com a possibilidade de uma gravidez de dois mezes.

A affirmação de um tumor surpreendeu a doente, que jámais se apercebera da existencia delle.

Oito dias depois desse meu primeiro

exame e como se tornassem cada vez mais intensas as dores soffridas pela paciente, que, então, só se sentia alliviada com repetidas injeções de morphina, fui convidado a vê-la de novo e indiquei uma intervenção.

É de notar, de passagem, que entre aquelle meu primeiro exame e esse outro, já se avolumára de muito o tumor, cujo limite superior crescêra, no curto espaço de oito dias, cerca de uns seis centímetros. Da mesma sorte se lhe modificára notavelmente a consistencia, que era agora molle, depressivel, quasi kystica.

Aqui, em face das alterações relatadas acima, a possibilidade de uma gravidez incluída num utero fibromatoso, grangeava fóros de quasi certeza. Eu não hesitei em affirmar-a.

Saltam á perspicacia dos gynecologos as razões em que se escudava a diagnose.

Com effeito, é lição por demais sabida que os fibromas são neoplasmas benignos, de marcha lenta e de consistencia rija. Sob a influencia da prenhez, entretanto, soffrem elles modificações importantes, das quaes justamente se destacam, um accrescimento


rapido e notavel do tumor, ao mesmo tempo que um certo amolecimento da sua massa, em virtude de uma infiltração edematosa. E essas modificações, como ensina Pozzi, "são tanto mais accentuadas quanto mais directa é a relação do fibroma com a matriz e quanto mais a estrutura delle se approxima da do musculo uterino. Estão nesse caso os fibromas intersticiaes.

Quatro dias depois, foi a doente operada por mim na Beneficencia Portuguesa, com a assistencia dos professores Mariante e Moysés e do dr. Aquino, que a anesthesiou.

Aberto o ventre, na linha mediana e afastadas as alças intestinaes, saltou á vista o fibroma.

A ablação do tumor, por hysterectomy supra vaginal, methodo dos americanos, foi das mais simples.


Empós a intervenção, que correu sem o mais leve incidente, examinámos a peça retirada. Uma incisão praticada na linha mediana do utero, para examinar o conteúdo da matriz, fez saltar de inopino a bolsa das aguas intacta, com um feto de dois mezes e pouco dentro della, como se verifica na photographia abaixo.



Não sabemos bemdizer a rara e casual felicidade desse córte que não scindiu as membranas ovulares, emmoldurando assim essa pega de incontestavel belleza.

Melhor se aquilata da elegancia della examinando a figura que segue e onde.

mercê de uma excellente photographia gentilmente tirada pelo meu collega professor Pereira Filho, nitidamente se percebe, nos seus menores detalhes, a bolsa das aguas emergindo do utero e trazendo, no seu bojo, o feto.



As sequencias operatorias não foram ensombradas por nenhum accidente. Retirei no sétimo dia os fios da parede abdominal e a ferida cicatrizou por primeira intenção.

Superfluo se torna justificar aqui a operação praticada: das linhas acima resalta, clara e precisa, a sua indicação formal.

Si é certo que, por via de regra, o utero

fibromatoso dá boa hospedagem á prenhez, que nelle á maravilha se desenvolve até o termo, menos verdade não é que causas varias, compromettendo o estado geral da paciente, reclamam o soccorro da cirurgia. Alistavam-se no rol de taes causas as dores violentas que, já desde o inicio da gestação, cruciavam a minha doente e lhe embargavam por completo o repouso.